

# លិខិតណែនាំបញ្ជូន

មកដល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

អ្នកជំងឺ \_\_\_\_\_ នេះ ប្រហែលជាត្រូវបានរងប៉ះពាល់នឹង \_\_\_\_\_ ។

ថ្នាំ **doxycycline** ឬ **ciprofloxacin** ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ការបង្ការដោយថ្នាំផ្សេងៗក្រោយការរងប៉ះពាល់ជំងឺ។

ខាងសខភាពសាធារណៈបានវាយតម្លៃអ្នកជំងឺនេះរកមើលការព្យាបាលបង្ការក្រោយការរងប៉ះពាល់នឹងជំងឺ ហើយត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកនៅក្នុងការចេញវេជ្ជបញ្ជា ឬចាត់ចែងការព្យាបាលបង្ការដែលសមស្រប។

នៅ \_\_\_\_\_ អ្នកជំងឺនេះបានទទួលការព្យាបាលបង្ការក្រោយការរងប៉ះពាល់នឹងជំងឺ នូវ៖  
(កាលបរិច្ឆេទ)

- Doxycycline 100mg លេប មួយថ្ងៃពីរដង x 10 ថ្ងៃ**       **Ciprofloxacin 500mg លេប មួយថ្ងៃពីរដង x 10 ថ្ងៃ**       **មិនបានផ្តល់ថ្នាំផ្សេងទេ**

	អ្នកជំងឺនេះ មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំ doxy ហើយ	សម្រាប់ប្រើដោយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ
<b>ផ្នែកទី 1</b>	<input type="checkbox"/> ក៏មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំ cipro ផងដែរ ។	សូមមើលតារាង 1 ហើយចេញវេជ្ជបញ្ជាបង្ការបង្ការផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ
	<input type="checkbox"/> កំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំ tizanidine (Zanaflex) ។	ថ្នាំ Cipro ត្រូវបានហាមប្រើដោយសារអន្តរកម្មឱសថធ្ងន់ធ្ងរ។ កាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំ tizanidine ក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលបង្ការដើម្បីបន្ថយហានិភ័យឱ្យដល់កម្រិតអប្បបរមា ឬ មើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយ បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មានវិបត្តិខ្សោយសាច់ដុំ (myasthenia gravis) ។	ថ្នាំ Cipro អាចនឹងធ្វើឱ្យវិបត្តិខ្សោយសាច់ដុំមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ (ការព្រមានដែលត្រូវបានសរសេរដាក់ក្នុងប្រអប់ – ការចៀសវាងគឺការប្រុងប្រយ័ត្ន)។ សូមមើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយបើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ឬចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro (500 ម.ក លេប ពីរដង មួយថ្ងៃ x 10 ថ្ងៃ) ហើយពិនិត្យតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។
	<input type="checkbox"/> មានជំងឺតម្រងនោម ។	សូមមើលតារាង 2 គណនាកម្រិតប្រើថ្នាំ cipro ដោយលែកម្រូវសម្រាប់អ្នកមានជំងឺតម្រងនោម បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មានប្រវត្តិប្រកាច់/ស្តួន ។	ថ្នាំ Cipro បង្កើនហានិភ័យនៃការប្រកាច់។ ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro (500 ម.ក លេប មួយថ្ងៃពីរដង x 10 ថ្ងៃ) ហើយពិនិត្យតាមដាន ឬមើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយ បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មិនអាចលេបថ្នាំគ្រាប់បាន ។	ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro ប្រភេទទឹកខាប់សម្រាប់លេបដោយផ្អែកលើ 15 ម.ក/គ.ក/កម្រិតប្រើ (អតិបរមា 500 ម.ក/កម្រិតប្រើ) រៀងរាល់ 12 ម៉ោងម្តង បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> ទម្ងន់តិចជាង 67 ផោន ។	គណនាកម្រិតប្រើប្រាស់ថ្នាំ cipro សមស្របផ្អែកលើ 15 ម.ក/គ.ក/កម្រិតប្រើ (អតិបរមា 500 ម.ក/កម្រិតប្រើ) រៀងរាល់ 12 ម៉ោងម្តង បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
<b>ផ្នែកទី 2</b>	<input type="checkbox"/> មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំ Cipro ហើយត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជា Doxycycline ជូន ។	ថ្នាំ Doxy អាចបណ្តាលឱ្យមានធ្មេញឡើងពណ៌ និងធ្មេញដុះមិនល្អចំពោះកុមារដែលម្តាយរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ហានិភ័យគឺអាស្រ័យថាតើផ្តល់វានៅពេលណា និងសម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មាន។ បន្តថ្នាំ doxy ឬមើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> កំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំ tizanidine (Zanaflex) ។	ថ្នាំ Cipro ត្រូវបានហាមប្រើដោយសារអន្តរកម្មឱសថធ្ងន់ធ្ងរ។ កាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំ tizanidine ក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលបង្ការដើម្បីបន្ថយឱ្យដល់កម្រិតអប្បបរមានូវហានិភ័យ ឬ មើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយបើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មានវិបត្តិខ្សោយសាច់ដុំ (myasthenia gravis) ។	ថ្នាំ Cipro អាចនឹងធ្វើឱ្យវិបត្តិខ្សោយសាច់ដុំមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ (ការព្រមានដែលត្រូវបានសរសេរដាក់ក្នុងប្រអប់ – ការចៀសវាងគឺការប្រុងប្រយ័ត្ន)។ សូមមើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយបើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ឬចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro (500 ម.ក លេប ពីរដង មួយថ្ងៃ x 10 ថ្ងៃ) ហើយពិនិត្យតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។
	<input type="checkbox"/> មានជំងឺតម្រងនោម ។	សូមមើលតារាង 2 គណនាកម្រិតប្រើថ្នាំ cipro ដោយលែកម្រូវសម្រាប់អ្នកជំងឺតម្រងនោមនៃឱសថ cipro បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មានប្រវត្តិប្រកាច់/ស្តួន ។	ថ្នាំ Cipro បង្កើនហានិភ័យនៃការប្រកាច់។ ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro (500 ម.ក លេប មួយថ្ងៃពីរដង x 10 ថ្ងៃ) ហើយពិនិត្យតាមដាន ឬ មើលតារាង 1 សម្រាប់របបថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស ហើយបើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> មិនអាចលេបថ្នាំគ្រាប់បាន ។	ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ cipro ប្រភេទទឹកខាប់សម្រាប់លេបផ្អែកលើ 15 ម.ក/គ.ក/កម្រិតប្រើ (អតិបរមា 500 ម.ក/ កម្រិតប្រើ) រៀងរាល់ 12 ម៉ោងម្តង បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
	<input type="checkbox"/> បានបដិសេធចំពោះឱសថ ។	សូមមើលតារាង 1 ចេញវេជ្ជបញ្ជាបង្ការបង្ការផ្សេងៗដើម្បីជម្រើសផ្សេងៗដំនួស បើកឱ្យប្រើសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ។

សម្រាប់សំណួរ សូមទាក់ទងខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់របស់ផ្នែកសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ៖

hotline # to go here

## លិខិតណែនាំបញ្ជូន

### សម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ

ផ្នែកដែលនៅសល់នៃលិខិតណែនាំបញ្ជូននេះ មានព័ត៌មានបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក ហើយមិនត្រូវបានបកប្រែទេ។