

# 의뢰서

친애하는 제공자님

이 환자 \_\_\_\_\_ 는 \_\_\_\_\_ 에 노출되었을 수 있습니다.

노출 후 예방적 항생제로 독시사이클린 또는 시프로플록사신이 제 1 차 약제로 간주됩니다. 공중 보건국은 이 환자에 대한 노출 후 예방 요법을 평가했으며 적절한 예방 요법을 처방하거나 관리하는 데 귀하의 도움이 필요합니다.

\_\_\_\_\_ 에 이 환자는 다음의 노출 후 예방 약제를 받았습니다.

(붙임)

- 독시사이클린 100mg po BID x 10 일
  시프로플록사신 500mg po BID x 10 일
  제공된 항생제 없음

		전용 의료 사용
1	이 환자는 독시에 대한 알레르기가 있으며	
	<input type="checkbox"/> 시프로에 대해서도 알레르기가 있습니다.	표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 규정하고 10 일 공급량을 제공합니다
	<input type="checkbox"/> 티자니딘(자나플렉스)을 복용하고 있습니다.	시프로는 그의 심각한 약물 상호작용으로 하여 사용이 금지됩니다. 위험을 최소화하기 위해 예방 치료 기간 동안 티자니딘을 줄이거나 중단합니다. 또는 표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 정하고 10 일 공급량을 제공합니다
	<input type="checkbox"/> 중증근무력증이 있습니다.	시프로는 근육 저하를 악화시킬 수 있습니다 (박스형 경고문 - 사용을 피하는 것이 상책입니다). 표 1을 참조하여 대체 항생제를 정하고 10 일 공급량을 제공하거나 시프로(500mg po BID x 10 일)를 처방하고 주의 깊게 모니터링합니다.
	<input type="checkbox"/> 신장질환이 있습니다.	표 2를 참조하여 시프로의 신장 투여량을 계산하고 10 일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 발작/간질 기왕력이 있습니다.	시프로가 발작의 위험을 증가시킵니다. 시프로(500mg po BID x 10 일)를 처방하고 표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 정하거나 10 일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 알약을 삼킬 수 없습니다.	12 시간마다 15mg/kg/복용량(최대 500mg/복용량)를 기준으로 시프로 경구용 현탁액을 처방하고 10 일 공급량을 제공합니다.
<input type="checkbox"/> 몸무게가 67 파운드 이하입니다.	12 시간마다 15mg/kg/복용량(최대 500mg/복용량)를 기준으로 적절한 시프로 복용량을 계산하고 10 일 공급량을 제공합니다.	

# 의뢰서

	이 환자는 임신 중이며	전용 의료 사용
<b>부록 2</b>	<input type="checkbox"/> 시프로에 대한 알레르기가 있어서 독시사이클린을 처방받았습니다	임신 중에 독시를 복용하는 경우 아기들에게 반점이 생기고 차아가 잘 형성되지 않을 수 있습니다. 위험은 언제 그리고 얼마나 오래 복용하는가에 따라 달라집니다. 독시를 계속 복용하거나 표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 정하고 10일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 티자니딘(자나플렉스)을 복용하고 있습니다.	시프로는 그의 심각한 약물 상호작용으로 하여 사용이 금지됩니다. 위험을 최소화하기 위해 예방 치료 기간 동안 티자니딘을 줄이거나 중단합니다. 또는 표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 정하고 10일 공급량을 제공합니다
	<input type="checkbox"/> 중증근무력증이 있습니다.	시프로는 근육 저하를 악화시킬 수 있습니다 (박스형 경고문 - 사용을 피하는 것이 상책입니다). 표 1을 참조하여 대체 항생제를 정하고 10일 공급량을 제공하거나 시프로(500mg po BID x 10일)를 처방하고 주의 깊게 모니터링합니다.
	<input type="checkbox"/> 신장질환이 있습니다.	표 2를 참조하여 시프로의 신장 투여량을 계산하고 10일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 발작/간질 기왕력이 있습니다.	시프로가 발작의 위험을 증가시킵니다. 시프로(500mg po BID x 10일)를 처방하고 표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 정하거나 10일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 알약을 삼킬 수 없습니다.	12시간마다 15mg/kg/복용량(최대 500mg/복용량)를 기준으로 시프로 경구용 현탁액을 처방하고 10일 공급량을 제공합니다.
	<input type="checkbox"/> 약을 거부했습니다	표 1을 참조하여 대체 항생제 요법을 처방하고 10일 공급량을 제공합니다.

문의 사항은 다음의 보건부 핫라인으로 문의해 주십시오:

\_\_\_\_\_ **hotline # to go here**

## 의료 사용 전용

이 의뢰서의 나머지 부분은 의료 제공자를 위한 기술 정보로 구성되며 번역되지 않았습니다.