

Уважаемый доктор!

Данный пациент _____ мог контактировать с _____.

Доксициклин ИЛИ цiproфлоксацин является препаратом первой линии для постконтактной антибиотикопрофилактики. Данный пациент прошел осмотр в учреждении общественного здравоохранения. Необходима Ваша помощь в назначении или ведении соответствующего профилактического лечения.

_____ пациент получил постконтактную профилактику:
(дата)

**100 мг доксициклина
внутри 2 р./сут. в
течение 10 дней**

**500 мг
ципрофлоксацина
внутри 2 р./сут. в
течение 10 дней**

**Антибиотик не
применяли**

ЧАСТЬ 1	Пациент страдает АЛЛЕРГИЕЙ на доксициклин, А ТАКЖЕ	Информация предназначена только для врачей
	<input type="checkbox"/> Страдает АЛЛЕРГИЕЙ на цiproфлоксацин	См. таблицу 1, назначьте альтернативную схему антибиотикотерапии, выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Принимает тизанидин (Занафлекс)	Цiproфлоксацин противопоказан по причине серьезных лекарственных взаимодействий. Уменьшите дозу или отмените тизанидин на время профилактики, чтобы минимизировать риск, ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Страдает миастенией гравис	Цiproфлоксацин может вызвать обострение мышечной слабости (предупреждение в рамке – целесообразно избегать приема). См. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней ИЛИ назначьте цiproфлоксацин (500 мг внутри 2 р./сут. в течение 10 дней) и продолжайте тщательное наблюдение
	<input type="checkbox"/> Страдает заболеванием почек	См. таблицу 2, рассчитайте дозировку цiproфлоксацина в зависимости от функции почек, выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> В анамнезе отмечаются судороги/эпилепсия	Цiproфлоксацин увеличивает риск судорог. Назначьте цiproфлоксацин (500 мг внутри 2 р./сут. в течение 10 дней) и продолжайте наблюдение ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Не может глотать таблетки	Назначьте цiproфлоксацин в виде суспензии для приема внутри в дозе 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 часов, выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Весит менее 30 кг	Рассчитайте соответствующую дозу цiproфлоксацина, исходя из дозировки 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 часов, выдайте препарат на 10 дней

ЧАСТЬ 2	Пациентка <u>БЕРЕМЕННА</u>, А ТАКЖЕ	Информация предназначена только для врачей
	<input type="checkbox"/> Страдает АЛЛЕРГИЕЙ на ципрофлоксацин, и ей был назначен доксициклин	Доксициклин может вызывать изменение цвета и нарушение формирования зубов у детей, матери которых принимали его во время беременности. Риск зависит от того, когда и как долго пациентка принимала данный препарат. Продолжайте курс доксициклина или см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Принимает тизанидин (Занафлекс)	Ципрофлоксацин противопоказан по причине серьезных лекарственных взаимодействий. Уменьшите дозу или отмените тизанидин на время профилактики, чтобы минимизировать риск, ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Страдает миастенией гравис	Ципрофлоксацин может вызвать обострение мышечной слабости (предупреждение в рамке – целесообразно избегать приема). См. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней ИЛИ назначьте ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 дней) и продолжайте тщательное наблюдение
	<input type="checkbox"/> Страдает заболеванием почек	См. таблицу 2, рассчитайте дозировку ципрофлоксацина в зависимости от функции почек, выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> В анамнезе отмечаются судороги/эпилепсия	Ципрофлоксацин увеличивает риск судорог. Назначьте ципрофлоксацин (500 мг внутрь 2 р./сут. в течение 10 дней) и продолжайте наблюдение ИЛИ см. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии и выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Не может глотать таблетки	Назначьте ципрофлоксацин в виде суспензии для приема внутрь в дозе 15 мг/кг/доза (максимальная доза 500 мг) каждые 12 часов, выдайте препарат на 10 дней
	<input type="checkbox"/> Отказывается принимать препарат	См. таблицу 1 для выбора альтернативной схемы антибиотикотерапии, выдайте препарат на 10 дней

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с управлением здравоохранения по номеру горячей линии:

hotline # to go here

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Остальные части этого письма-направления содержат техническую информацию для врача и не подлежат переводу.