

Лист-направлення

Шановний лікарю!

Цей пацієнт _____ міг контактувати з _____.

Доксициклін АБО ципрофлоксацин є препаратом першої лінії для постконтактної антибіотикопрофілактики. Цього пацієнта було оглянуто в установі охорони здоров'я стосовно постконтактної профілактики. Необхідна Ваша допомога у призначенні або введенні відповідного профілактичного лікування.

_____ пацієнт отримав постконтактну профілактику:
(дата)

100 мг доксицикліну
всередину 2 р/добу
протягом 10 днів

500 мг
ципрофлоксацину
всередину 2 р/добу
протягом 10 днів

Антибіотик не
застосовували

РОЗДІЛ 1	Цей пацієнт має <u>АЛЕРГІЮ на доксициклін, А ТАКОЖ</u>	Інформація призначена лише для лікарів
	<input type="checkbox"/> Також має АЛЕРГІЮ на ципрофлоксацин	Див. таблицю 1, призначте альтернативну схему антибіотикотерапії, видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Приймає тизанідин (Занафлекс)	Ципрофлоксацин протипоказаний через серйозні лікарські взаємодії. Зменшіть дозу або припиніть застосування тизанідину на час профілактики, щоб мінімізувати ризик, АБО див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Має міастенію гравіс	Ципрофлоксацин може спричинити загострення м'язової слабкості (попередження у рамці – доцільно уникати прийому). Див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів АБО призначте ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і продовжуйте ретельне спостереження
	<input type="checkbox"/> Має захворювання нирок	Див. таблицю 2, розрахуйте дозування ципрофлоксацину залежно від функції нирок, видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Має судоми/епілепсію в анамнезі	Ципрофлоксацин збільшує ризик судом. Призначте ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і продовжуйте спостереження АБО див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Не може ковтати таблетки	Призначте ципрофлоксацин у вигляді оральної суспензії в дозі 15 мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 годин, видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Має масу тіла менше 30 кг	Розрахуйте відповідну дозу ципрофлоксацину на основі дозування 15 мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 годин, видайте препарат на 10 днів

РОЗДІЛ 2	Ця пацієнтка <u>ВАГІТНА, А ТАКОЖ</u>	Інформація призначена лише для лікарів
	<input type="checkbox"/> Має АЛЕРГІЮ на ципрофлоксацин, і їй було призначено доксициклін	Доксициклін може спричиняти зміну кольору і порушення формування зубів у дітей, матері яких приймали його під час вагітності. Ризик залежить від того, коли і як довго приймали цю речовину. Продовжуйте курс доксицикліну або див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів
	<input type="checkbox"/> Приймає тизанідин (Занафлекс)	Ципрофлоксацин протипоказаний через серйозні лікарські взаємодії. Зменшіть дозу або припиніть застосування тизанідину на час профілактики, щоб мінімізувати ризик, АБО див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і

Лист-направлення

	видайте препарат на 10 днів
<input type="checkbox"/> Має міастенію гравіс	Ципрофлоксацин може спричинити загострення м'язової слабкості (попередження у рамці – доцільно уникати прийому). Див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів АБО призначте ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і продовжуйте ретельне спостереження
<input type="checkbox"/> Має захворювання нирок	Див. таблицю 2, розрахуйте дозування ципрофлоксацину залежно від функції нирок, видайте препарат на 10 днів
<input type="checkbox"/> Має судоми/епілепсію в анамнезі	Ципрофлоксацин збільшує ризик судом. Призначте ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і продовжуйте спостереження АБО див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів
<input type="checkbox"/> Не може ковтати таблетки	Призначте ципрофлоксацин у вигляді оральної суспензії в дозі 15 мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 годин, видайте препарат на 10 днів
<input type="checkbox"/> Відмовилася приймати препарат	Див. таблицю 1, призначте альтернативну схему антибіотикотерапії, видайте препарат на 10 днів

Якщо Ви маєте запитання, будь ласка, зверніться до управління охорони здоров'я за номером гарячої лінії:

hotline # to go here

ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ЛИШЕ ДЛЯ ЛІКАРІВ

Решта частин цього листа-направлення містять технічну інформацію для лікаря та їх не треба перекладати.